

Informe sobre la situación de COVID-19 en España

Informe COVID-19 nº 19. 1 de abril de 2020

Contenido

Introducción	3
Casos notificados de COVID-19 en España	4
Características demográficas y clínicas	5
Antecedentes epidemiológicos de riesgo.....	9
Características clínicas y gravedad	9
Principales resultados.....	13
Nota metodológica	14
Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo.....	15

Introducción

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China), con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo virus de la familia *Coronaviridae*, que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2¹. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional COVID-19. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. Posteriormente, la OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020.

En España, las comunidades autónomas (CCAA) notifican diariamente al Ministerio de Sanidad las cifras de casos confirmados acumulados de COVID-19: total casos, casos en profesionales sanitarios, hospitalizaciones, ingreso en UCI, fallecidos y casos recuperados.

Al mismo tiempo, las CCAA completan, según acceden a la información, la encuesta individualizada para cada uno de dichos casos. La encuesta incluye información clínico-epidemiológica consensuada y aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), y la notifican mediante la plataforma informática SiViES (Sistema para la Vigilancia en España) que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología.

Este informe contiene información de los casos de COVID-19 notificados al Centro Nacional de Epidemiología a través de la plataforma SiViES hasta la extracción de datos (12:00 h del 1 de abril de 2020): 52.129 casos que suponen el 51% de los 102.136 totales en España cuantificados hasta el día 31 de marzo de 2020 (21:00 h). Su objetivo es obtener una información detallada sobre las características clínicas y epidemiológicas de los casos de COVID-19 y los factores que pueden estar asociados a una mayor gravedad. Los resultados deben confirmarse con posteriores actualizaciones de COVID-19 en SiViES.

¹ <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>

Casos notificados de COVID-19 en España


Tabla 1. Distribución por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

CCAA	Casos ¹	Casos notificados a la RENAVE ²
Andalucía	6392	4277
Aragón	2491	554
Asturias	1322	841
Baleares	1131	631
Canarias	1380	1393
Cantabria	1213	1204
Castilla La Mancha	7047	3494
Castilla y León	6847	3266
Cataluña	19991	1928
Comunitat Valenciana	5922	4907
Extremadura	1679	1699
Galicia	4432	292
Madrid	29840	21481
Murcia	1041	996
Navarra	2497	1496
País Vasco	6838	2203
La Rioja	1960	1395
Ceuta	51	29
Melilla	62	43
Total	102136	52129

¹Notificación agregada de casos de COVID-19 hasta las 21:00h del 31 de marzo de 2020

²Extracción de datos de SiViES a las 12:00h del 1 de abril de 2020

Figura 1. Curva epidémica por fecha de inicio de síntomas¹ y fecha de diagnóstico¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE



¹Los datos de los recuadros sombreados pueden estar afectados por retraso en la notificación o diagnóstico

Características demográficas y clínicas

Tabla 2. Características demográficas y clínicas. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE¹

Características		Total N (%)	Mujeres N (%)	Hombres N (%)	p-valor
Total		52129	25948 (49,8)	26153 (50,2)	
Edad	Mediana (RIC) ²	59 (45-74)	57 (43-73)	62 (47-75)	<0,001
Grupo de edad (años)	<2	98 (0,2)	42 (0,2)	56 (0,2)	
	2-4	39 (0,1)	20 (0,1)	19 (0,1)	
	5-14	176 (0,3)	92 (0,4)	84 (0,3)	
	15-29	3048 (5,9)	1846 (7,2)	1199 (4,6)	
	30-39	5335 (10,3)	3060 (11,9)	2274 (8,8)	
	40-49	7960 (15,4)	4228 (16,4)	3729 (14,4)	
	50-59	9449 (18,3)	4903 (19,0)	4541 (17,5)	
	60-69	8694 (16,8)	3972 (15,4)	4717 (18,2)	
	70-79	8648 (16,7)	3509 (13,6)	5137 (19,8)	
	≥80	8322 (16,1)	4108 (15,9)	4213 (16,2)	<0,001
Síntomas	Fiebre o reciente historia de fiebre	4911 (77,0)	2265 (71,9)	2639 (82,0)	<0,001
	Tos	4772 (76,6)	2351 (75,8)	2411 (77,3)	0,174
	Dolor de garganta	1368 (26,0)	793 (29,8)	569 (21,9)	<0,001
	Disnea	2734 (44,7)	1272 (42,1)	1457 (47,3)	<0,001
	Escalofríos	1582 (35,0)	754 (33,4)	824 (36,5)	0,029
	Vómitos	480 (9,1)	286 (10,8)	192 (7,4)	<0,001
	Diarrea	1500 (27,9)	803 (29,5)	694 (26,3)	0,007
	Neumonía (radiológica o clínica)	14575 (38,8)	5869 (32,4)	8700 (44,9)	<0,001
	Síndrome de distrés respiratorio agudo	547 (5,5)	187 (3,8)	359 (7,2)	<0,001
	Otros síntomas resp.	3332 (9,5)	1476 (8,6)	1856 (10,3)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo	Fallo renal agudo	646 (1,9)	224 (1,3)	422 (2,4)	<0,001
		20090 (49,6)	9036 (45,7)	11045 (53,3)	<0,001
	Enfermedad cardiovascular	4329 (10,7)	1762 (8,9)	2562 (12,4)	<0,001
	Enfermedad respiratoria	1294 (3,2)	470 (2,4)	822 (4,0)	<0,001
	Diabetes	2362 (5,8)	943 (4,8)	1417 (6,8)	<0,001
Hospitalización	Hipertensión arterial*	500 (1,2)	238 (1,2)	262 (1,3)	0,577
		23102 (49,5)	9443 (41,1)	13647 (57,7)	<0,001
	Ventilación mecánica	868 (3,2)	240 (1,8)	626 (4,3)	<0,001
	Admisión UCI ³	1624 (5,1)	449 (2,9)	1172 (7,2)	<0,001
	Defunción	3077 (5,9)	1106 (4,3)	1971 (7,5)	<0,001
Inicio síntomas hasta diagnóstico (días)	Mediana (RIC) ²	5 (2-8)	4 (2-7)	5 (2-8)	<0,001
Inicio síntomas hasta notificación CCAA (días)	Mediana (RIC) ²	14 (9-18)	14 (9-18)	14 (10-18)	<0,001
Inicio síntomas hasta hospitalización (días)	Mediana (RIC) ²	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	0,625
Inicio síntomas hasta ingreso en UCI (días)	Mediana (RIC) ²	7 (5-10)	7 (4-10)	7 (5-10)	0,456
Inicio síntomas hasta defunción (días)	Mediana (RIC) ²	9 (5-12)	8 (5-12)	9 (6-12)	0,135
Estancia en hospital (días)	Mediana (RIC) ²	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (2-7)	0,006
Estancia en UCI (días)	Mediana (RIC) ²	4 (2-7)	3 (1-7)	4 (2-7)	0,302

¹Porcentaje sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información. ²RIC: rango intercuartil. ³UCI: Unidad de cuidados intensivos.

*La información sobre hipertensión arterial se recoge a partir del 18/03/2020. Datos actualizados a 01-04-2020.

Edad y sexo

Figura 2. Distribución por edad y sexo. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE y población española




Tabla 3.1 Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, total

Grupo de edad (años)	Casos N (%)	Hospitalizados N (%)	UCI N (%)	Defunciones N (%)	Letalidad ¹ (%)
<2	98 (0,2)	49 (0,2)	3 (0,2)	1 (0,0)	1,02
2-4	39 (0,1)	12 (0,1)	1 (0,1)	0 (0,0)	0,00
5-14	176 (0,3)	26 (0,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,00
15-29	3048 (5,8)	478 (2,1)	24 (1,5)	6 (0,2)	0,20
30-39	5335 (10,2)	1098 (4,8)	62 (3,8)	11 (0,4)	0,21
40-49	7960 (15,3)	2294 (9,9)	131 (8,1)	41 (1,3)	0,52
50-59	9449 (18,1)	3439 (14,9)	279 (17,2)	86 (2,8)	0,91
60-69	8694 (16,7)	4577 (19,8)	487 (30,0)	272 (8,8)	3,13
70-79	8648 (16,6)	5863 (25,4)	563 (34,7)	857 (27,9)	9,91
≥80	8322 (16,0)	5239 (22,7)	73 (4,5)	1802 (58,6)	21,65
Total	52129 (100)	23102 (100)	1624 (100)	3077 (100)	5,90

¹ Defunciones/casos. Datos actualizados a 01-04-2020.

Tabla 3.2. Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, mujeres

Grupo de edad (años)	Casos N (%)	Hospitalizados N (%)	UCI N (%)	Defunciones N (%)	Letalidad ¹ (%)
<2	42 (0,2)	18 (0,2)	0 (0,0)	1 (0,1)	2,38
2-4	20 (0,1)	7 (0,1)	1 (0,2)	0 (0,0)	0,00
5-14	92 (0,4)	11 (0,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,00
15-29	1846 (7,1)	238 (2,5)	10 (2,2)	2 (0,2)	0,11
30-39	3060 (11,8)	513 (5,4)	19 (4,2)	3 (0,3)	0,10
40-49	4228 (16,3)	901 (9,5)	36 (8,0)	16 (1,4)	0,38
50-59	4903 (18,9)	1344 (14,2)	79 (17,6)	24 (2,2)	0,49
60-69	3972 (15,3)	1831 (19,4)	127 (28,3)	78 (7,1)	1,96
70-79	3509 (13,5)	2235 (23,7)	147 (32,7)	236 (21,3)	6,73
≥80	4108 (15,8)	2329 (24,7)	30 (6,7)	746 (67,5)	18,16
Total	25948 (100)	9443 (100)	449 (100)	1106 (100)	4,26

Datos actualizados a 01-04-2020.

Tabla 3.3. Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, hombres

Grupo de edad (años)	Casos N (%)	Hospitalizados N (%)	UCI N (%)	Defunciones N (%)	Letalidad ¹ (%)
<2	56 (0,2)	31 (0,2)	3 (0,3)	0 (0,0)	0,00
2-4	19 (0,1)	5 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,00
5-14	84 (0,3)	15 (0,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	0,00
15-29	1199 (4,6)	238 (1,7)	14 (1,2)	4 (0,2)	0,33
30-39	2274 (8,7)	585 (4,3)	43 (3,7)	8 (0,4)	0,35
40-49	3729 (14,3)	1390 (10,2)	94 (8,0)	25 (1,3)	0,67
50-59	4541 (17,4)	2094 (15,3)	199 (17,0)	62 (3,1)	1,37
60-69	4717 (18,0)	2743 (20,1)	360 (30,7)	194 (9,8)	4,11
70-79	5137 (19,6)	3626 (26,6)	415 (35,4)	621 (31,5)	12,09
≥80	4213 (16,1)	2909 (21,3)	43 (3,7)	1056 (53,6)	25,07
Total	26153 (100)	13647 (100)	1172 (100)	1971 (100)	7,54

Datos actualizados a 01-04-2020.

Figura 3. Distribución por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE





Figura 4. Porcentaje de casos y defunciones por grupo de edad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE



Antecedentes epidemiológicos de riesgo

Tabla 4. Antecedentes epidemiológicos de riesgo. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE ¹

Antecedentes epidemiológicos	Total N(%)	Mujeres N(%)	Hombres N(%)	p-valor
Contacto estrecho con casos COVID-19 probable o confirmado	1023 (51,3)	618 (58,2)	405 (43,6)	<0,001
Contacto con persona con infección respiratoria aguda	1268 (61,7)	707 (66,3)	560 (56,7)	<0,001
Profesional sanitario	3964 (27,4)	2758 (37,1)	1206 (17,2)	<0,001
Visita a centro sanitario	75 (11,9)	43 (13,0)	31 (10,7)	0,369
Viaje a Hubei	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	.
Contacto con animales en casos importados	6 (1,0)	4 (1,3)	2 (0,7)	0,479

¹Porcentaje sobre los casos de COVID-19 de los que se disponía de información. Datos actualizados a 01-04-2020.

Características clínicas y gravedad

Tabla 5. Características de los casos según presencia de neumonía¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹		Con neumonía N (%)	Sin neumonía N (%)	p-valor
Total		14575 (39)	22952 (61)	
Sexo	Mujeres	5869 (40)	12256 (53)	
	Hombres	8700 (60)	10689 (47)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²		68 (54-78)	55 (42-70)	<0,001
Grupo de edad (años)	<2	8 (0)	69 (0)	
	2-4	7 (0)	22 (0)	
	5-14	11 (0)	83 (0)	
	15-29	281 (2)	1834 (8)	
	30-39	709 (5)	2984 (13)	
	40-49	1548 (11)	4035 (18)	
	50-59	2303 (16)	4381 (19)	
	60-69	2933 (20)	3574 (16)	
	70-79	3692 (25)	3117 (14)	
	≥80	3080 (21)	2814 (12)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo	Una o más	9666 (69)	7886 (36)	<0,001
Enfermedad cardiovascular	Sí	2195 (16)	1482 (7)	<0,001
Enfermedad respiratoria	Sí	628 (4)	483 (2)	<0,001
Diabetes	Sí	1222 (9)	750 (3)	<0,001
Otra	Sí	1995 (14)	1532 (7)	<0,001
Hospitalización	Sí	13590 (94)	5808 (27)	<0,001
Ventilación mecánica	Sí	701 (7)	118 (1)	<0,001
Admisión UCI	Sí	1152 (10)	235 (1)	<0,001
Defunción	Sí	1974 (14)	669 (3)	<0,001

¹Análisis sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre la presencia o ausencia de neumonía. ²Rango Inter cuartilico. Datos actualizados a 01-04-2020.

Tabla 6. Características según hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹		Hospitalizados UCI N (%)	Hospitalizados no UCI N (%)	p-valor
Total		1616 (10)	15069 (90)	
Sexo	Mujeres	443 (27)	6247 (41)	
	Hombres	1170 (72)	8818 (59)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²		66 (57-73)	69 (55-79)	<0,001
Grupo de edad (años)	<2	3 (0)	35 (0)	
	2-4	1 (0)	7 (0)	
	5-14	0 (0)	13 (0)	
	15-29	24 (1)	336 (2)	
	30-39	60 (4)	781 (5)	
	40-49	130 (8)	1513 (10)	
	50-59	278 (17)	2201 (15)	
	60-69	486 (30)	2827 (19)	
	70-79	561 (35)	3778 (25)	
	≥80	72 (4)	3566 (24)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo	Una o más	1062 (76)	9137 (63)	<0,001
Enfermedad cardiovascular	Sí	393 (28)	1717 (12)	<0,001
Enfermedad respiratoria	Sí	88 (6)	527 (4)	<0,001
Diabetes	Sí	233 (17)	817 (6)	<0,001
Otra	Sí	229 (14)	1216 (8)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica)	Sí	1152 (83)	9232 (65)	<0,001
Síndrome de distrés respiratorio agudo	Sí	264 (40)	168 (5)	<0,001
Ventilación mecánica	Sí	677 (59)	179 (1)	<0,001
Defunción	Sí	230 (14)	1860 (12)	0,029

¹Porcentaje sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre las variables señaladas. ²Rango Inter cuartílico. Datos actualizados a 01-04-2020.

Tabla 7. Características según defunción¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹		Defunción N (%)	No defunción N (%)	p-valor
Total		3077 (6)	49052 (94)	
Sexo	Mujeres	1106 (36)	24842 (51)	
	Hombres	1971 (64)	24182 (49)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²		82 (75-87)	58 (44-72)	<0,001
Grupo de edad (años)	<2	1 (0)	97 (0)	
	2-4	0 (0)	39 (0)	
	5-14	0 (0)	176 (0)	
	15-29	6 (0)	3042 (6)	
	30-39	11 (0)	5324 (11)	
	40-49	41 (1)	7919 (16)	
	50-59	86 (3)	9363 (19)	
	60-69	272 (9)	8422 (17)	
	70-79	857 (28)	7791 (16)	
	≥80	1802 (59)	6520 (13)	<0,001
Profesional sanitario	Sí	3 (0)	3961 (29)	<0,001
Hospitalización	Sí	2768 (91)	20334 (47)	<0,001
Admisión UCI	Sí	230 (10)	1394 (5)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo	Una o más	2435 (87)	17655 (47)	<0,001
Enfermedad cardiovascular	Sí	577 (21)	3752 (10)	<0,001
Enfermedad respiratoria	Sí	161 (6)	1133 (3)	<0,001
Diabetes	Sí	330 (12)	2032 (5)	<0,001
Otra	Sí	566 (18)	3606 (7)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica)	Sí	1974 (75)	12601 (36)	<0,001
Síndrome de distrés respiratorio agudo	Sí	138 (30)	409 (4)	<0,001
Ventilación mecánica	Sí	157 (8)	711 (3)	<0,001


¹Porcentaje sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre las variables señaladas. ²Rango Inter cuartílico. Datos actualizados a 01-04-2020.

Tabla 8. Características según nivel de gravedad¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹		No hospitalizados	Hospitalizados no UCI, no defunción	UCI o defunción	p-valor
		N (%)	N (%)	N (%)	
Total		23310	13209	4463	
Sexo	Mujeres	13436 (58)	5594 (42)	1488 (33)	
	Hombres	9864 (42)	7611 (58)	2972 (67)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²		51 (53-76)	66 (39-63)	77 (39-63)	<0,001
Grupo de edad (años)	<2	42 (0)	35 (0)	4 (0)	
	2-4	20 (0)	7 (0)	1 (0)	
	5-14	116 (0)	13 (0)	0 (0)	
	15-29	2216 (10)	332 (3)	29 (1)	
	30-39	3631 (16)	777 (6)	66 (1)	
	40-49	4845 (21)	1495 (11)	161 (4)	
	50-59	5066 (22)	2159 (16)	345 (8)	
	60-69	3290 (14)	2698 (20)	704 (16)	
	70-79	2016 (9)	3286 (25)	1305 (29)	
	≥80	2015 (9)	2395 (18)	1846 (41)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo	Una o más	4895 (26)	7529 (60)	3315 (83)	<0,001
Enfermedad cardiovascular	Sí	966 (5)	1468 (12)	904 (23)	<0,001
Enfermedad respiratoria	Sí	319 (2)	459 (4)	238 (6)	<0,001
Diabetes	Sí	468 (3)	709 (6)	524 (13)	<0,001
Otra	Sí	1148 (5)	1027 (8)	755 (17)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica)	Sí	859 (5)	7854 (64)	2960 (77)	<0,001
Ventilación mecánica	Sí	6 (0)	138 (1)	718 (24)	<0,001

¹Análisis sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre la gravedad. ²Rango Intercuartílico. Datos actualizados a 01-04-2020.

Figura 5. Distribución por sexo y edad según el nivel de gravedad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE



Novedades respecto al informe anterior

- Los hombres tienen una mayor prevalencia de síntomas que las mujeres, excepto en el caso de dolor de garganta, vómitos y diarrea, que es mayor en las mujeres.
- Se estima que un 3,2% de pacientes necesitan ventilación mecánica, 4,3% en hombres y 1,8% en mujeres.
- La mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico y la hospitalización es de 5 días; desde el inicio de síntomas hasta el ingreso en UCI de 7 días, y hasta la defunción de 9 días. Estas estimaciones deben ser confirmadas con la actualización de las encuestas de casos y en análisis próximos.
- El porcentaje de pacientes mayores de 80 años que ingresan en UCI disminuye drásticamente respecto a grupos más jóvenes (4,5% del total de casos en UCI). Este porcentaje de mayores de 80 años entre los ingresados en UCI es menor en hombres (3,7%) que en mujeres (6,7%).
- Se acrecienta la diferencia de infección por COVID-19 entre profesionales sanitarios según sexo: 2758 afectadas (37% de las mujeres con información sobre esta variable) y 1206 afectados (17% del total de hombres con información sobre esta variable).
- El porcentaje de pacientes admitidos en UCI que requieren ventilación mecánica en este análisis es menor de lo que cabría esperar (59%). Estas estimaciones deben ser confirmadas con la actualización de las encuestas de casos y en análisis próximos.

Principales resultados

- Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 se han notificado 102.136 casos de COVID-19 en España, de los que se ha recibido información en SiViES de 52.129 casos (51%) hasta las 12:00 h del 1 de abril de 2020.
- El 50,2% de los casos de COVID-19 son hombres y la mediana de edad es 59 años, siendo mayor en hombres que en mujeres (62 vs 57 años). Los síntomas más frecuentes que se refieren son fiebre, tos, disnea y escalofríos, y uno de cada tres pacientes presentó clínica digestiva (diarrea o vómitos). Los hombres presentan una mayor prevalencia de fiebre y disnea, mientras que el dolor de garganta y la clínica digestiva es significativamente más frecuente en mujeres. Un 49% de los casos notificados a SiViES han sido hospitalizados, 39% han desarrollado neumonía, un 5,1% han sido admitidos en UCI y un 5,9% han fallecido. Los hombres presentan una mayor prevalencia de neumonía, enfermedades de base (cardiovascular, respiratoria, diabetes), y un mayor porcentaje de hospitalización, admisión en UCI, ventilación mecánica y letalidad que las mujeres.
- La distribución por sexo y grupo de edad indica que los casos de COVID-19, con respecto a la distribución de la población española, están sobrerrepresentados entre los mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres, aunque de forma más acusada en los hombres a partir de los 60 años. Por el contrario, la presentación de casos de COVID-19 en menores de 25 años de ambos sexos es muy baja.
- Un 27% de los casos notificados a SiViES son trabajadores sanitarios.
- En un análisis específico sobre neumonía se observa que los pacientes con neumonía son significativamente mayores que los que no presentan neumonía (68 vs 55 años, respectivamente). Los hombres, las personas mayores de 60 años y las que presentan enfermedad de base (especialmente enfermedad cardiovascular y diabetes) están más representados entre los pacientes que presentan neumonía. Como es de esperar, el porcentaje de hospitalización, ventilación mecánica, admisión en UCI y defunción es significativamente mayor en los casos con neumonía.

- Los pacientes ingresados en UCI son significativamente más jóvenes que los hospitalizados sin ingreso en UCI (66 vs 69 años), siendo el porcentaje de pacientes mayores de 80 años con ingreso en UCI del 4% frente al 24% en el grupo de hospitalizados sin ingreso en UCI. Entre los ingresados en UCI, frente a los hospitalizados sin ingreso en UCI, están más representados los hombres y existe una mayor prevalencia de enfermedades de base, neumonía y otras complicaciones respiratorias.
- Según la información disponible hasta el momento, la letalidad de los casos de COVID-19 notificados a SiViES es de 5,9%, con un rango desde 0% para los menores de 15 años hasta 21,6% para los mayores de 80 años. Estos resultados deben interpretarse con precaución, puesto que se han considerado como no fallecidos los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis.
- En una escala de gravedad de 1) casos no hospitalizados, 2) casos hospitalizados (no UCI, no defunción) y 3) casos admitidos en UCI o fallecidos, se observa que el porcentaje de pacientes de mayores de 70 años aumenta de 18% en pacientes no hospitalizados a 70% en pacientes con ingreso en UCI o fallecidos. A medida que aumenta la gravedad se observa también un mayor porcentaje de hombres y de pacientes con enfermedad de base. La prevalencia de enfermedad de base es de 20% en los casos no hospitalizados, 59% en los casos hospitalizados y 82% en los casos ingresados en UCI o fallecidos. En definitiva, los hombres, los pacientes de mayor edad y con enfermedades de base y factores de riesgo están más representados a medida que aumenta la gravedad.
- En un análisis específico sobre defunción se observa que los pacientes fallecidos son significativamente mayores (82 vs 58 años), los hombres están más representados, presentan más frecuentemente enfermedades de base, neumonía y otras complicaciones respiratorias, y han sido hospitalizados e ingresados en UCI con mayor frecuencia.
- En la pirámide de distribución de casos por sexo y edad, en función de la gravedad se observa un predominio de mujeres en los casos no hospitalizados y de hombres en los que requieren hospitalización. El número de casos hospitalizados y no hospitalizados, por debajo de los 25 años, es bajo en ambos sexos. La mayoría de casos hospitalizados sin ingreso en UCI ni defunción, así como los casos con ingreso en UCI o defunción, se dan entre hombres, superando ampliamente a la proporción de mujeres a partir de los 45 años, y de forma más acusada a partir de los 70 años.

Nota metodológica

Desde el principio de la pandemia de COVID-19, la vigilancia de los casos de esta enfermedad en España se basa en la notificación universal de todos los casos confirmados de COVID-19 que se identifican en cada CCAA. Las CCAA notifican al nivel central esta información de dos formas diferentes:

- Una notificación diaria del número de casos agregados de COVID-19 por CCAA al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del Ministerio de Sanidad. Los datos contienen información sobre casos totales, casos en profesionales sanitarios, hospitalizados, admisiones en UCI, fallecidos y recuperados.
- Una notificación individualizada de casos de COVID-19 a la RENAVE a través de la plataforma informática vía Web SiViES que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Esta información procede de la encuesta epidemiológica de caso que cada CA cumplimenta ante la identificación de un caso de COVID-19 y contiene datos demográficos, epidemiológicos y clínicos de los casos de COVID-19 identificados en España. Para conseguir una información completa de cada caso, la CA debe realizar sucesivas actualizaciones de la información de la encuesta porque no siempre toda la información está disponible desde la identificación del caso, o precisa de una actualización según cambia la evolución clínica del paciente. Las actualizaciones de la información de los casos las realizan las CCAA, según disponen de ellas, en la plataforma SiVies mediante un determinado soporte

electrónico. Para ello, las CCAA reciben el apoyo permanente del equipo SiVies del CNE. Sin embargo, la situación de intensísima carga de trabajo en todas las Unidades de Salud Pública de las CCAA implica un esfuerzo muy importante para lograr la notificación individualizada a la RENAVE, especialmente, su actualización para completar la información de la encuesta epidemiológica de caso.

Mientras que la notificación agregada se acerca más a la realidad de la evolución de la pandemia de COVID-19 en España, la información de la RENAVE es todavía incompleta, si bien puede ofrecer una información más precisa sobre las características epidemiológicas y clínicas o los factores de riesgo y enfermedades de base que podrían estar asociados a los casos de COVID-19 identificados en España.

Los datos agregados de COVID-19 se pueden consultar en: <https://covid19.isciii.es/>

La información individualizada debe ser consolidada con sucesivas actualizaciones para evitar interpretaciones erróneas durante su análisis.

Es importante resaltar que todos los resultados son provisionales y deben interpretarse con precaución, porque se ofrece información de cada variable con la información disponible para cada una de ellas. En el caso de “defunción”, hemos considerado como “no defunción” los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis.

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo

MoMo es un sistema de vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas que proporciona información sobre el impacto en la mortalidad de la población de todo evento que pueda suponer una amenaza para la Salud Pública. Sus resultados pueden apoyar las evaluaciones de riesgo de dichos eventos y contribuir a guiar adecuadamente la respuesta de salud pública y el desarrollo de políticas de control.

Mediante el sistema MoMo, el Centro Nacional de Epidemiología estima los excesos de mortalidad por todas las causas por sexo y grupos de edad y a nivel nacional y por CCAA. Los resultados son estimaciones de exceso de defunciones por todas las causas, es decir, son excesos de defunciones de carácter inespecífico que no se pueden atribuir directamente a una causa determinada.

Por otra parte, en el momento actual observamos un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias CCAA, por lo que los resultados deben interpretarse con precaución, especialmente en los últimos días y siempre deben ser confirmados con el análisis de los próximos días.

Las estimaciones de MoMo pueden consultarse aquí: [Informes MoMo 2020](#)