


Le délai pour concevoir un enfant

Il faut en moyenne sept mois à un couple pour concevoir un enfant

Obtenir une grossesse n'est pas immédiat. Sur 100 couples désirant un enfant, 25 % seulement obtiennent la grossesse désirée au cours du mois. Parmi les 75 % qui ne l'ont pas obtenue, seulement un quart obtiennent une grossesse à la fin du deuxième mois, tandis que les autres doivent de nouveau essayer le mois suivant, et ainsi de suite... En moyenne, les couples mettent sept mois pour obtenir une grossesse.

La mortalité précoce des embryons à l'origine de ce délai



L'espèce humaine se distingue dans ce domaine des autres espèces de mammifères, dont les femelles sont presque toutes fécondées dans un délai très court lorsque survient la saison des amours.

Le faible taux de succès chez l'Homme s'expliquerait de la façon suivante : la plupart des couples obtiennent bien une fécondation, mais l'œuf qui en résulte meurt très fréquemment dans les quinze jours suivants, souvent en raison d'anomalies génétiques. Il est évacué avec les règles qui surviennent normalement. La femme, qui n'a pas de retard de règles, ne sait pas qu'elle a été fécondée. Cette mortalité précoce des embryons est très importante, et bien supérieure à celle survenant après le quinzième jour de grossesse, qui se manifeste par des avortements spontanés.

Pour en savoir plus (www.ined.fr):

- « Les naissances » (Animation)
- « Le jeu de la famille » (Animation)
- « L'espèce humaine a-t-elle un problème de fertilité? » (Henri Leridon, *Population & Sociétés*, n°471, octobre 2010)
- « Stérilité, fertilité : la part des hommes » (E. de La Rochebrochard, *Population & Sociétés*, n°371, septembre 2001)
- « Démographie : analyse et synthèse II. Les déterminants de la fécondité » (H. Leridon, sous la dir. de G. Cazelli, J. Vallin, G. Wunsch, chap 30 & 31, Ined, 2002)

